Khovanov homologies of some pretzel knots

結び目の数理 III

吉田純*

December 25, 2020

概要

Khovanov homology was developed by Khovanov in 2000 as a categorification of the Jones polynomial. In a recent paper, the speaker found a brand-new method for the computation of Khovanov homology based on a categorified analogue of Vassiliev skein relation, which was constructed in a joint work with N. Ito. In this talk, we will see how it works in computation of Khovanov homologies of some pretzel knots.

1 イントロダクション

Khovanov ホモロジーは [Khovanov, 2000] にて導入された絡み目不変量である。より具体的には、Khovanov は各絡み目図式 D に対して、二重次数付きの鎖複体 $C^{*,*}(D)$ を構成し、その各次数毎のホモロジー群が Reidemeister 移動によって不変であることを示した。 D が絡み目 L の図式である時、このホモロジー群を $Kh^{*,*}(L)$ と書く。Khovanov ホモロジーの最も重要な性質は、その次数付き Euler 数が以下の式の意味で Jones 多項式 $V(L)$ を復元することである:

$$\sum_{i,j} (-1)^i q^j \dim_{\mathbb{Q}} Kh^{i,j}(L) \otimes \mathbb{Q} = (t^{1/2} + t^{-1/2})V(L) \Big|_{t=q^2} . \quad (1.1)$$

この性質により、Khovanov ホモロジーは標語的に **Jones 多項式の圏化** であると呼ばれる。特に Khovanov ホモロジーは量子不変量と呼ばれる不変量のクラスに数えられており、実際に [Cautis and Kamnitzer, 2008] では導来圏による圏論的な組紐群の表現から Khovanov ホモロジーが構成できることが示されている。

* 東京工業大学情報理工学院 / 東京大学大学院数理科学研究科

図1 Pretzel 結び目 $P(-2l + 1, -2m + 1, 2n)$

本稿ではその結果をさらに推し進め、特異絡み目上での Khovanov ホモロジーを具体的な計算を紹介する。

最初の主結果は、Khovanov ホモロジーが、特異点に隣接する 2 本の紐の full twist に対して安定的であることを示している：

主定理 A. *Khovanov* ホモロジー上に以下の同型がある：

$$Kh^{i,j} \left(\begin{array}{c} \nearrow \\ \text{---} \\ \searrow \end{array} \right) \cong Kh^{i+2,j+4} \left(\begin{array}{c} \nearrow \\ \text{---} \\ \searrow \end{array} \right) .$$

主定理 A と圏化された Vassiliev スケイン関係式 (1.3) を組み合わせることによって、いくつかの結び目の無限系列の Khovanov ホモロジーを決定することができる。講演者は [Yoshida, 2020] で全てのツイスト結び目の Khovanov ホモロジーを決定したが、本稿では図 1 のタイプの Pretzel 結び目の場合を取り上げる。次の結果は Pretzel 結び目の Khovanov ホモロジーがフルツイストについて安定化することを示している：

主定理 B. (1) 以下の写像で $i > -2n + 1$ または $j > -1 - 4n$ で同型となるものが存在する：

$$Kh^{i,j}(P(-3, -1, 2n + 2)) \rightarrow Kh^{i,j}(P(-3, -1, 2n)) .$$

(2) 同様に、以下の写像で $i > -2n + 1$ または $j > -3 - 4n$ で同型となるものが存在する：

$$Kh^{i,j}(P(-3, -3, 2n + 2)) \rightarrow Kh^{i,j}(P(-3, -3, 2n)) ,$$

2 Khovanov ホモロジーの復習

主定理の証明をする前に、Khovanov ホモロジーを簡単に復習する。結び目図式 D に

対し、その交点の集合を $c(D)$ と書き、その部分集合 $s \subset c(D)$ のことを D 上のステートと呼ぶ。各ステート $s \subset c(D)$ に対し、 D の s による平滑化 (smoothing) D_s を D の各交点 $c \in c(D)$ の近傍を以下のルールで置き換えて得られる平面上の部分多様体とする：

$$\begin{array}{c} \text{X} \xleftarrow{c \notin s} \text{X}_c \xrightarrow{c \in s} \text{X} \end{array} .$$

定義から、 D_s は円周 S^1 の有限個の非交和になることに注意する。 D 上の enhanced ステートとは、ステート $s \subset c(D)$ と写像

$$e : \pi_0(D_s) \rightarrow \{1, x\}$$

の組 (s, e) のことである。ここで、 $\pi_0(D_s)$ は D_s の連結成分の集合である。 $|s|$ で s の濃度とし、

$$|e| := \#\{c \in c(D) \mid e(c) = 1\} - \#\{c \in c(D) \mid e(c) = x\}$$

とおく。

定義. 上の状況で、各整数 i, j についてアーベル群 $C^{i,j}(D)$ を以下で定義する：

$$C^{i,j}(D) := \mathbb{Z}\{(s, e) \mid |s| = i + n_-, |e| = j - i - w(D)\} , \quad (2.1)$$

ここで、 n_- と $w(D)$ はそれぞれ D の負交点の数とひねり数 (writhe) である。

今、この二重次数付きアーベル群 $C^{*,*}(D)$ に微分

$$d^i : C^{i,j}(D) \rightarrow C^{i+1,j}(D) \quad (2.2)$$

を定義する。このために、可換環 $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2)$ が以下の演算によって Frobenius 代数になることに注意する：

$$\begin{aligned} \Delta(1) &= 1 \otimes x + x \otimes 1, & \Delta(x) &= x \otimes x, \\ \varepsilon(1) &= 0, & \varepsilon(x) &= 1. \end{aligned}$$

Frobenius 代数と 2 次元の TQFT の同値性から、 A は以下のような対称モノイダル関手を定める：

$$Z_A : \mathbf{Cob}_2 \rightarrow \mathbf{Ab}; \quad (S^1)^{\amalg n} \mapsto A^{\otimes n} ,$$

ここで $\mathbf{Cob}_2$ と $\mathbf{Ab}$ はそれぞれ $2 (= 1 + 1)$ 次元のコボルディズムの圏及びアーベル群の圏である。特に $Z_A(S^1) \cong \mathbb{Z}\{1, x\}$ であるが、これを $\deg 1 = 1, \deg x = 1$ によって次数付けすることで次数付きアーベル群とみなす。式 (2.1) より以下の同型がわかる：

$$C^{i,j}(D) \cong \bigoplus_{|s|=i+n_-} Z_A(D_s)^{j-i-w(D)} .$$

さらに $c \in c(D) \setminus s$ の時、以下の写像がある:

$$\delta_c := Z_A \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A box with a vertical line on the left and a horizontal line on the top, with a red 'c' label.} \end{array} \right) : Z_A(D_s) = Z_A \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A crossing with a red 'c' label on the right strand.} \end{array} \right) \rightarrow Z_A \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A crossing with a red 'c' label on the left strand.} \end{array} \right) = Z_A(D_{s \cup \{c\}}) \quad .$$

これを用いて微分 (2.2) を $d = \sum_c \pm \delta_c$ として定義する。ただし、符号の決め方は [Khovanov, 2000] や [Bar-Natan, 2002] を参照されたい。

定理 2.1 ([Khovanov, 2000]). 上の状況で、各整数 i, j について、ホモロジー群 $H^i(C^{*,j}(D))$ は *Reidemeister* 移動について不変である。

L が D の結び目である時、 $Kh^{i,j}(L) := H^i(C^{*,j}(D))$ と書き、 L の **Khovanov** ホモロジーと呼ぶ。式 (1.1) は、式 (2.1) と Kauffman ブラケットの enhanced ステートによる記述より、直ちに従う。

さて、Vassiliev 理論の観点から、[Ito and Yoshida, 2020b] では以下の式で定義される写像が議論されている:

$$\Phi := Z_A \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A box with a circle inside and a red 'c' label.} \end{array} \right) - Z_A \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A box with a loop on top and a red 'c' label.} \end{array} \right) : C^{*,*} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: Two parallel red strands with arrows pointing up.} \end{array} \right) \rightarrow C^{*,*-2} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: Two parallel red strands with arrows pointing up.} \end{array} \right) \quad .$$

定理 2.2 ([Ito and Yoshida, 2020b]). 上の写像 Φ は以下の鎖複体の射 $\widehat{\Phi}$ を誘導する:

$$\widehat{\Phi} : C^{*,*} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A crossing with a red 'c' label on the right strand.} \end{array} \right) \rightarrow C^{*,*} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A crossing with a red 'c' label on the left strand.} \end{array} \right) \quad .$$

さらに以下が成立する:

- (1) $\widehat{\Phi}$ の写像錐 $\text{Cone}(\widehat{\Phi})$ のホモトピー型は、特異絡み目図式の移動によって不変である。これによって *Khovanov* ホモロジーは特異絡み目の不変量に拡張される:

$$Kh^{i,j} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A crossing with a blue dot at the intersection.} \end{array} \right) := H^i \left(\text{Cone} \left(C^{*,j} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A crossing with a red 'c' label on the right strand.} \end{array} \right) \xrightarrow{\widehat{\Phi}} C^{*,j} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A crossing with a red 'c' label on the left strand.} \end{array} \right) \right) \right) \quad . \quad (2.3)$$

- (2) 拡張された *Khovanov* ホモロジーは以下の意味で *FI* 関係式を満たす:

$$Kh^{*,*} \left(\begin{array}{c} \text{Diagram: A loop with a blue dot at the center.} \end{array} \right) = 0 \quad .$$

3 主定理 A の証明

証明に入る前に、まず Khovanov ホモロジーの構成から、以下の鎖複体の短完全列が存在することに注意する:

$$0 \rightarrow C^{*,j+1} \left(\begin{array}{c} \nearrow \nearrow \\ \searrow \searrow \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha} C^{*,j} \left(\begin{array}{c} \nearrow \searrow \\ \searrow \nearrow \end{array} \right) \xrightarrow{\beta} C^{\bullet,*} \left(\begin{array}{c} \searrow \searrow \\ \nearrow \nearrow \end{array} \right) \rightarrow 0 \quad (3.1)$$

ここで、第 3 項には標準的な向きを選び方は一般には存在しないが、射 β を隣り合う 2 つの交点にそれぞれ適用することで、向きまで込めて以下の鎖複体の射を得る:

$$\beta^2 : C^{*,*} \left(\begin{array}{c} \nearrow \nearrow \\ \searrow \searrow \end{array} \right) \rightarrow C^{*+2,*+4} \left(\begin{array}{c} \nearrow \nearrow \\ \searrow \searrow \end{array} \right) .$$

この射と定理 2.2 を用いて主定理 A を証明する。より具体的には、以下の形の β^2 がホモロジー上に同型を誘導することを示せば十分である:

$$\beta^2 : C^{*,j} \left(\begin{array}{c} \nearrow \nearrow \\ \searrow \searrow \end{array} \right) \xrightarrow{\beta} C^{\bullet,*} \left(\begin{array}{c} \nearrow \nearrow \\ \searrow \searrow \end{array} \right) \xrightarrow{\beta} C^{*+2,j+4} \left(\begin{array}{c} \nearrow \nearrow \\ \searrow \searrow \end{array} \right) = C^{*+2,j+4} \left(\begin{array}{c} \nearrow \searrow \\ \searrow \nearrow \end{array} \right) \quad (3.2)$$

ただし、ここで第 2 項については、図式の向きを決めれば次数は一意に定まることに注意する。さて、最初の β について、完全列 (3.1) より以下の短完全列を得る:

$$0 \rightarrow C^{*,j+1} \left(\begin{array}{c} \nearrow \nearrow \\ \searrow \searrow \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha} C^{*,j} \left(\begin{array}{c} \nearrow \searrow \\ \searrow \nearrow \end{array} \right) \xrightarrow{\beta} C^{\bullet,*} \left(\begin{array}{c} \nearrow \searrow \\ \searrow \nearrow \end{array} \right) \rightarrow 0 .$$

ところが、FI 関係式 (定理 2.2 (2)) より、第 1 項のホモロジー群は自明であるから、鎖複体の短完全列が誘導するホモロジー長完全列を見ることで、この β はホモロジー群の上で同型を誘導することがわかる。同様にして、(3.2) の他方の β もホモロジー群上で同型であることがわかり、従って β^2 もホモロジー群の上で同型を誘導する。これにより、主定理 A は示された。

4 Pretzel 結び目のホモロジー

主定理 A を利用して $P(-2l+1, -2m+1, 2n)$ の形の Pretzel 結び目のいくつかの Khovanov ホモロジーを計算することができる。記号を簡単にするため、ここでは整数 l, m については固定し、 $K(n) = P(-2l+1, -2m+1, 2n)$ とおく。アイデアとしては、圏化された Vassiliev スケイン関係式によって、 n に関して帰納的に Khovanov ホモロジーを決定していく。

図2 $G(n)$ の図式

まず図 2 にある特異結び目図式 $G(n)$ を考える。主定理 A から、

$$Kh^{i,j}(G(n+1)) \cong Kh^{i+2,j+4}(G(n)) \cong \dots \cong Kh^{i+2n,j+4n}(G(1)) \quad . \quad (4.1)$$

一方、圏化された Vassiliev スケイン関係式 (1.3) より、Khovanov ホモロジーの次の完全列がある:

$$Kh^{i-1,j}(G(n+1)) \rightarrow Kh^{i,j}(K(n+1)) \xrightarrow{\widehat{\Phi}} Kh^{i,j}(K(n)) \rightarrow Kh^{i,j}(G(n+1)) \quad . \quad (4.2)$$

この完全列と同型 (4.1) により、以下が証明できる:

命題 4.1. 上の状況で、以下が成立する:

- (1) ある整数 i_0 が存在して、整数の組 i, j について $i \geq i_0$ ならば $Kh^{i,j}(G(1)) = 0$ であるとする、 $i > i_0 - 2n$ ならば、任意の j について写像

$$\widehat{\Phi} : Kh^{i,j}(K(n+1)) \rightarrow Kh^{i,j}(K(n)) \quad (4.3)$$

は同型である。

- (2) ある整数 j_0 が存在して、整数の組 i, j について $j \geq j_0$ ならば $Kh^{i,j}(G(1)) = 0$ であるとする、 $j \geq j_0 - 4n$ ならば、任意の i について写像 (4.3) は同型である。

命題 4.1 によって、実際に $Kh^{i,j}(G(1))$ を計算することで、主結果 B を確かめることができる。以下に $(l, m) = (2, 1), (2, 2)$ の場合の群 $Kh^{i,j}(G(1))$ を計算機によって求めたものを表で示す。なお、計算に用いたプログラムのソースコードは以下から入手できる:

<https://github.com/Junology/khover>

$l = 2, m = 1$ の時

$i \setminus j$	-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
-6	$\mathbb{Z}$	0	0	0	0	0	0	0
-5	0	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$	0	0	0	0	0
-4	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0	0	0
-3	0	0	0	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$	0	0	0
-2	0	0	0	0	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$	0	0
-1	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0
0	0	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$

$l = m = 2$ の時

$i \setminus j$	-17	-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3
-6	$\mathbb{Z}^2$	0	0	0	0	0	0	0
-5	0	$(\mathbb{Z}/2)^2$	$\mathbb{Z}^2$	0	0	0	0	0
-4	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0	0	0
-3	0	0	0	$\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$	0	0	0
-2	0	0	0	0	$(\mathbb{Z}/2)^2$	$\mathbb{Z}^2$	0	0
-1	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}$	0	0
0	0	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$

謝辞とお詫び

結び目の数理論 III の世話人の先生方に感謝申し上げます。また、講演ではプログラムのバグを取り切れず、不完全な計算結果を提示してしまったことをお詫び申し上げます。

参考文献

- [Bar-Natan, 2002] Bar-Natan, D. (2002). On Khovanov's categorification of the Jones polynomial. *Algebraic & Geometric Topology*, 2(1):337–370.
- [Birman, 1993] Birman, J. S. (1993). New points of view in knot theory. *American Mathematical Society. Bulletin. New Series*, 28(2):253–287.
- [Birman and Lin, 1993] Birman, J. S. and Lin, X.-S. (1993). Knot polynomials and Vassiliev's invariants. *Inventiones Mathematicae*, 111(2):225–270.

- [Cautis and Kamnitzer, 2008] Cautis, S. and Kamnitzer, J. (2008). Knot homology via derived categories of coherent sheaves. I. the $\mathfrak{sl}(2)$ -case. *Duke Mathematical Journal*, 142(3):511–588.
- [Ito and Yoshida, 2020a] Ito, N. and Yoshida, J. (2020a). Crossing change on Khovanov homology and a categorified Vassiliev skein relation. *Journal of Knot Theory and Its Ramifications*, 29(07):2050051. arXiv:1911.09308.
- [Ito and Yoshida, 2020b] Ito, N. and Yoshida, J. (2020b). Universal Khovanov homology for singular tangles and a categorified Vassiliev skein relation. arXiv:2005.12664.
- [Khovanov, 2000] Khovanov, M. (2000). A categorification of the Jones polynomial. *Duke Mathematical Journal*, 101(3):359–426.
- [Yoshida, 2020] Yoshida, J. (2020). Decomposition of the first Vassiliev derivative of Khovanov homology and its application. arXiv:2007.15867.